UNA MONTAGNA DI VITA

Ecosistemi d'alta quota e cambiamenti climatici

Andrea Lami e Michela Rogora
con il contributo dei colleghi del CNR IRSA di Verbania

I laghi montani, specchi dei cambiamenti globali

CNR Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA)
Verbania Pallanza
<http://www.ise.cnr.it>

L'Istituto di Ricerca sulle Acque – sede Verbania Consiglio Nazionale delle Ricerche

Personale:

Vi lavorano circa 50 persone (tempo indeterminato e determinato, borsisti, assegnisti, laureandi e dottorandi) nei settori scientifico, tecnico e amministrativo

Infrastrutture: Laboratori (chimica, biologia, microbiologia)

Biblioteca (libri, riviste, miscellanea)

Imbarcazioni

Strumentazione per campionamenti e misure in campo

Principali ambienti studiati in Italia...

Laghi alpini d'alta quota

Laghi profondi subalpini
(Maggiore, Orta, Lugano,
Como, Iseo, Garda)

Laghi vulcanici
dell'Italia Centrale

Inoltre:

Altri laghi minori e corsi
d'acqua

Deposizioni atmosferiche
sull'arco alpino e in più di
20 aree forestali

... e nel mondo

Laghi in aree remote (Patagonia,
Isole Svalbard, Himalaya, Antartide)

Water towers

- ✓ Le montagne “catturano” acqua dall’atmosfera e la accumulano sotto forma di neve e ghiaccio, che vanno ad alimentare corsi d’acqua e laghi
- ✓ Metà della popolazione mondiale dipende dalle montagne per l’acqua potabile o per l’energia idroelettrica

MOUNTAINS AS THE WATER TOWERS OF THE WORLD
A CALL FOR ACTION ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Laghi di pianura

*Variabilità meteo-climatica
meno accentuata e
mitigata dal lago stesso*

*Varie forme di
disturbo antropico*

Reti trofiche complesse

Laghi di montagna

*Condizioni
meteo-climatiche
«estreme»*

*Disturbo antropico
limitato o indiretto*

Reti trofiche semplificate

**CAMBIAMENTI
CLIMATICI**

Effetti per lo più indiretti
Interazione con altri fattori
Lag temporale nelle risposte

Effetti sia diretti che indiretti
Laghi come indicatori

La catena alimentare in un lago alpino

Le attività di ricerca

✓ **1938 – 1951:** utilizzo dei laghi alpini per capire le connessioni tra lago e bacino imbrifero

✓ **1951 - 1983:** i laghi alpini come laboratori naturali per verificare teorie ecologiche e per studi biogeografici

✓ **1984 - oggi:** i laghi alpini come indicatori per studiare la risposta alle pressioni antropiche

I laghi alpini come indicatori

✓ Non interessati da disturbo antropico diretto (e.g. scarichi urbani ed industriali, agricoltura)

✓ Soggetti alla deposizione di inquinanti atmosferici trasportati con le masse d'aria dalle zone industrializzate/urbanizzate

✓ Soggetti a condizioni climatiche estreme, fortemente influenzati dalle caratteristiche dei bacini imbriferi (pendenza, copertura litologica, idrologia)

Indicatori dei cambiamenti globali,
come la deposizione di inquinanti atmosferici
(composti acidificanti e a azoto)
e le variazioni climatiche

Le ricerche CNR IRSA, Verbania

Caratteristiche chimiche (e biologiche) dei laghi dagli anni '70 - '80

Chimica delle deposizioni atmosferiche dagli anni '70-'80

Dati meteo da stazioni ARPA Piemonte e ENEL

- ◇ Laghi
- Deposizioni

Campionamenti

Variabili

Un inquinamento che arriva da lontano

Gli inquinanti, emessi in aree fortemente antropizzate, possono viaggiare per km insieme alle masse d'aria, raggiungendo le aree remote, e venire qui ridepositati attraverso le deposizioni ("Long-range Transboundary Air Pollution")

L'acidificazione e la ripresa dei laghi alpini: una storia di successo

Riduzione emissioni

Oggi le piogge non sono piu' "acide",
ma rappresentano comunque un veicolo
di altri inquinanti (composti azotati, metalli
pesanti, microinquinanti organici)
agli ecosistemi, soprattutto in aree remote

I cambiamenti climatici sulle Alpi

Le variazioni termiche sulle Alpi sono molto più marcate rispetto a quelle a scala globale ed emisferica e si prevede che il riscaldamento climatico nei prossimi decenni sia più intenso nelle regioni di montagna rispetto alle aree di bassa quota (IPCC, 2001)

1880-1900

Temperature change (1951-1980 baseline)

2014-2018

NASA's Scientific Visualization Studio

Laghi come sentinelle dei cambiamenti climatici

Science 13 February 2009:
Vol. 323 no. 5916 pp. 887-888
DOI: 10.1126/science.1169443

PERSPECTIVE

CLIMATE CHANGE

Sentinels of Change

Craig E. Williamson¹, Jasmine E. Saros², David W. Schindler³

Limnol. Oceanogr., 54(6, part 2), 2009, 2283-2297
© 2009, by the American Society of Limnology and Oceanography, Inc.

Lakes as sentinels of climate change

Rita Adrian,^{a,*} Catherine M. O'Reilly,^b Horacio Zagarese,^c Stephen B. Baines,^d Dag O. Hessen,^e Wendel Keller,^f David M. Livingstone,^g Ruben Sommaruga,^h Dietmar Straile,ⁱ Ellen Van Donk,^j Gesa A. Weyhenmeyer,^k and Monika Winder^l

Riscaldamento
delle acque

Durata della copertura
ghiacciata

Riduzione di livello e superficie

Eutrofizzazione

Fioriture algali

Produttività

Biodiversità

Cambiamenti «macro» e «micro»

Bolivia's second-largest lake dries up and may be gone forever, lost to climate change

As Andean glaciers disappear, so do the sources of Lake Poopó's water, say scientists who blame a warming environment, El Niño and mining

Fattori climatici : 1. TEMPERATURA

Ossola Superiore - Indice di anomalia termica (SAI) annuale
dal 1929 al 2015

Fattori: 2. Neve al suolo

Ossola Superiore - Indice di anomalia durata neve al suolo (SAI) dal 1929-30 al 2013-14

Ossola Superiore - Indice di anomalia spessore medio neve al suolo (SAI) dal 1929-30 al 2015-16

Effetti del cambiamento climatico

SHARE
Stelvio
Stations at High Altitude for Research on the Environment

Formazione di nuovi laghi in aree recentemente deglacializzate (laghi epi e periglaciali)

Scomparsi molti dei laghi alle quote più basse (< 2500 m) per aumento dell'evaporazione

Comparsa di molti nuovi laghi alle quote più elevate (>2900 m) a seguito del ritiro dei ghiacciai

I "nuovi" laghi sono di natura effimera, ovvero destinati a loro volta a scomparire

2. Aumento di volume ed eventuale instabilità dei laghi

GLOF
Glacial Lake
Outburst Flood

<http://www.nimbus.it/ghiacciai/2001/010902rocciamel.htm>

3. Cambiamenti nella composizione chimica delle acque

La degradazione della criosfera (nevai, ghiacciai, permafrost) è un'altra conseguenza del riscaldamento climatico, che a sua volta può avere effetti sui laghi

Laghi e ghiacciai

Il ritiro dei ghiacciai porta alla formazione di nuovi laghi, in evoluzione e a volte instabili, con potenziali rischi per il fondovalle (es. Lago Effimero)

I laghi esistenti possono subire modificazioni morfometriche e chimiche, con potenziali effetti sulle biocenosi

Lago Gemelli di Ban

Laghi e ghiacciai

Lago delle Locce

4. Effetti sulla biodiversità

Le condizioni “estreme” dei laghi d’alta quota selezionano specie adattate a vivere in questi ambienti

**I macroinvertebrati
come indicatori**

Il riscaldamento climatico può portare a modificazioni nella composizione in specie e alla scomparsa di specie sensibili

Lago Bianco del Gavia

Effetti indiretti

Mediante thermistor con data-logger si possono monitorare temperatura e livello del lago e valutare la lunghezza del periodo di copertura ghiacciata e la sua relazione con i parametri meteorologici

Lago Paione Superiore

Effetti «a catena»

Degrado del permafrost

Arretramento ghiacciai

Diminuzione copertura di neve al suolo

↑ weathering

Cambiamenti nella composizione chimica

Riduzione copertura ghiacciata

Effetti sulle biocenosi

Qualche conclusione

ICP WATERS

Nonostante la collocazione “remota”, le acque in alta quota non sono esenti dagli effetti dell’inquinamento, derivante dal trasporto a lungo raggio, e dei cambiamenti climatici

Le variazioni climatiche avranno un ruolo sempre più importante nei prossimi decenni nell’ecologia di questi ambienti, con effetti sia diretti che indiretti

Per conoscere e proteggere questi ecosistemi fragili sono necessari studi a lungo termine!

Il lungo termine.... La paleolimnologia nello studio dei laghi

P. Guilizzoni, A. Lami, A. Marchetto, S. Musazzi

Che cos'è la paleolimnologia?

La paleolimnologia è la branca della limnologia che si occupa dello studio e dell'analisi dei sedimenti lacustri attraverso il prelievo di carote di sedimento.

Proxy-record

Questi sono alcuni dei parametri, in questo caso biologici e chimici, i cosiddetti proxy-record, tratti da diverse discipline, la cui minore o maggiore presenza nel sedimento indica particolari condizioni ambientali, fisiche, chimiche del lago e la loro evoluzione nel corso del tempo.

Il Lago Ledro (Trentino) e la sua evoluzione secolare ricostruita dai sedimenti

Diatom ecology and environmental reconstruction

Geochemistry and pigments proxies

Lago Cristallina, Central Alps

Lago Cristallina, Central Alps

Lago Cristallina, Central Alps

Grazie a

Il personale tecnico e scientifico del CNR ISE
di Verbania Pallanza

Gli instancabili "cercatori" di laghi...