Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Ecosistemi montani in un mondo che cambia

Giorgio Matteucci

**Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo
CNR – ISAFOM**

giorgio.matteucci@cnr.it

UNA MONTAGNA DI VITA
Ecosistemi d'alta quota e cambiamenti climatici
Ciclo di Conferenze – 13 Febbraio 2019

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Aspetti definitivi e generali

UNA MONTAGNA DI VITA

Ecosistemi d'alta quota e cambiamenti climatici

Ciclo di Conferenze – 13 Febbraio 2019

✓ L'Ecologia si interessa di tre livelli (scale) di studio

- ✓ L'organismo **individuale**
(autoecologia)
- ✓ La popolazione: insieme di individui della stessa specie
(demoecologia)
- ✓ Le comunità: popolazioni che vivono in uno stesso luogo
(sinecologia)

Ecosistema (Tansley, 1935):
“tutte le specie animali si sono evolute in comunità in cui erano presenti altre specie animali e vegetali. Ogni comunità tende a comparire in un particolare tipo di habitat. Questo dipende sia dalle esigenze delle singole specie, sia dall'interdipendenza di specie differenti per quanto riguarda le risorse. Questi complessi naturali di specie animali e vegetali, insieme alle condizioni chimiche e fisiche in cui essi vivono sono detti ecosistemi”.

SUBDIVISIONS OF ECOLOGY

Ecosystem ecology (e.g., study of biomass production and nutrient cycling)

La risorsa primaria è l'energia fornita dal sole

Calore

Fotosintesi: fissazione energia radiante in energia chimica

Settori ed interazioni all'interno dell'ecosistema

Consumatori secondari

Consumatori primari

Produttori

Catena di detrito

Catena di pascolamento

Strati in un ecosistema forestale

Kimmins, 1987

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Ecosistemi e montagne

UNA MONTAGNA DI VITA

Ecosistemi d'alta quota e cambiamenti climatici

Ciclo di Conferenze – 13 Febbraio 2019

Clima e vegetazione: comparazione tra latitudine e altitudine

A partire dall'Equatore, al variare della latitudine verso Nord e verso Sud, esiste un gradiente di temperatura decrescente (come medie annuali).

Nell'emisfero boreale, a livello del mare, questo gradiente è pari a circa 0.6°C per ogni grado di latitudine

Esiste anche un gradiente di temperatura al variare della quota altimetrica.

Questo gradiente è di circa 0.55°C per ogni 100 m di quota (sempre come medie annuali).

Un aumento di quota di 1 m corrisponde circa ad uno spostamento di 1 km verso Nord

La “montagna” ci interessa in modo particolare perché, in Italia, le foreste sono maggiormente localizzate in montagna e collina

Clima di montagna

- ✓ Diminuzione della temperatura con la quota
- ✓ Diminuzione della pressione
- ✓ Aumento della radiazione solare (UV ed albedo)
- ✓ Aumento delle precipitazioni (effetto orografico)
- ✓ Precipitazioni nevose (nelle Alpi circa 20-25% a 1000 m, 50-60% a 2000 m)
- ✓ Ruolo dell'esposizione e della pendenza (microclima)

Biomi, clima e latitudine-altitudine

Distribuzione altimetrica dei tipi di vegetazione in Italia

Fig. 9.8. Distribuzione altimetrica della vegetazione sulle Dolomiti, in Abruzzo e sull'Etna. (1) senza vegetazione; (2) fascia alpica; (3) fascia boreale; (4) fascia subatlantica; (5) fascia centroeuropea (Alpi) e sannitica (Abruzzo, Etna); (6) fascia mediterranea; (7) fascia mediterranea arida.

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Le foreste

UNA MONTAGNA DI VITA
Ecosistemi d'alta quota e cambiamenti climatici
Ciclo di Conferenze – 13 Febbraio 2019

Foreste in Italia

- Foreste italiane: 10'467'533 ha, 34.7% superficie territoriale
- (INFC, 2007 CFS e CRA-MPF)
- Assorbimento: ~80 Mt CO₂
- (Inv. emis gas serra, 2007 APAT)

**Gestione forestale e protocollo di Kyoto per l'Italia:
10 Mt CO₂ (pari a circa il 10% dell'impegno al 2008)**

Le foreste montane in Italia

Tree species	Aboveground Wood Biomass		Growth	
	Mg	Mg ha ⁻¹	m ³	m ³ ha ⁻¹
Larch and stone pine	41,560,488	108.7	1,282,925	3.36
Norway spruce	113,574,186	193.8	4,567,710	7.79
Fir	15,776,163	230.4	565,119	8.25
Scots and Mountain pine	16,844,819	111.1	529,251	3.49
Austrian and Calabrian pine	29,645,581	125.4	1,404,011	5.94
Beech	183,976,744	177.7	5,597,810	5.41
Italian total	866,731,507	101.0	34,885,362	4.06
Percentage of italian total	46.3	156.3	40.0	140.6

Foreste ricche di biomassa e produttive!

<http://www.sian.it/inventarioforestale/>

Dove è andato a finire il Carbonio immesso in atmosfera: Sorgenti e assorbitori di C negli ultimi 200 anni (sino al 2000)

Fig. 1 Carbon sources and sinks over the last two centuries (PgC).

Set-up per le misure di scambio (flussi)

Cicli giornalieri in diverse stagioni

Andamento annuale dello Scambio Netto di Ecosistema - NEE

Collelongo 2006

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Ecosistemi montani: Fortemente dinamici

UNA MONTAGNA DI VITA

Ecosistemi d'alta quota e cambiamenti climatici

Ciclo di Conferenze – 13 Febbraio 2019

Successione primaria

La successione primaria é l'insediamento e lo sviluppo di una comunità vegetale in habitat di nuova formazione in cui la copertura vegetale era assente

Esempi:

- Dune sabbiose
- Morene di ghiacciaio
- Colate laviche
- Laghi o paludi prosciugate

Primary succession on a terrestrial site.

11.01.2006

11.01.2006

Successione secondaria

La successione secondaria si verifica quando la colonizzazione avviene in un habitat che era già precedentemente provvisto di una copertura vegetale

Esempi:

- Incendi
- Altri disturbi naturali (vento, inondazione, ecc.)
- Abbandono di pratiche agricole, pascolive, cedui
- Valanghe
- Frane (intermedio tra successione primaria e secondaria)

Dinamiche successionali nella ricolonizzazione dei campi abbandonati

Figure 15.1

Typical sequence of plant communities that might be observed occupying a plowed field or scarified clearcut in coastal British Columbia over the subsequent 100-year period. The photographs show representative communities for three stages: (A) herb-shrub-young deciduous tree; (B) deciduous tree; and (C) maturing conifer. (D) A drawing showing the variations over the period in the importance values of the different vegetation forms. In similar "old-field" successions in other regions, a conifer forest stage (frequently consisting of pines) may follow the shrub stage, to be replaced in time by a final deciduous stage.

Kimmins, 1987

Superficie forestale e popolazione in Italia

Agnoletti et al., 2006

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Il clima cambia

Cosa sta succedendo agli ecosistemi?

UNA MONTAGNA DI VITA
Ecosistemi d'alta quota e cambiamenti climatici
Ciclo di Conferenze – 13 Febbraio 2019

Aumento della temperatura **globale**, dal 1850 a oggi

2018

12-month moving average
Anomalies relative to 1951-1980 mean

CC BY-4.0
Robert A. Rohde (@rarohde)
Berkeley Earth (www.BerkeleyEarth.org)

Global Mean Temperature

Meteo
giornale

Anomalie termiche estate
2017 rispetto al periodo 1971-
2000. Elaborazione ISAC-CNR

-41%
pioggia

+2,48°C
temperatura

2° estate più calda dal 1800
4° estate più secca dal 1800

La «ten years challenge» vista dal lato del clima

WORLD
METEOROLOGICAL
ORGANIZATION

WEATHER CLIMATE WATER

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Inizio anticipato della stagione vegetativa nell'emisfero Nord

Fig. 1 Spring indices (SI) first leaf date 1961–2000 trend by station. Trend values are in days per year and colors show categories. Stations with trends significant at the 0.05 level or better are shown with larger symbols outlined in black.

2003: anomalia estiva di temperatura

Luterbacher et al, Science 2004

Schar et al, Nature 2004

Figure 1 Characteristics of the summer 2003 heatwave. **a**, JJA temperature anomaly with respect to the 1961–90 mean. Colour shading shows temperature anomaly (°C), bold contours display anomalies normalized by the 30-yr standard deviation. **b–e**, Distribution of Swiss monthly and seasonal summer temperatures for 1864–2003. The fitted gaussian distribution is indicated in green. The values in the lower left corner of each panel list the standard deviation (σ) and the 2003 anomaly normalized by the 1864–2000 standard deviation (T/σ). See Methods section for further details.

Estati calde: effetti in faggeta (Abruzzo)

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Recenti cambiamenti nella produttività primaria 2000-2009

Zhao and Running, Science, 2010

Effetti gelata tardiva dopo inizio anticipato stagione vegetativa (2016 – Appennino Centro Meridionale)

Research paper

Assessing spring frost effects on beech forests in Central Apennines from remotely-sensed data

Marco Bascietto^a, Sofia Bajocco^{b,c}, Francesco Mazzenga^c, Giorgio Matteucci^d

COPERNICUS

Emergency Management Service

EU countries

- Total EU
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Italy**
- Latvia
- Poland
- Portugal

Burnt Areas

Number of Fires

SEASONAL TREND - Italy

	2017 Fires Count	2008 - 2016 Average Num of Fires
01-Jan	0	0
08-Jan	1	0
15-Jan	1	0

2018: Vaia

Foreste per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per gli obiettivi del protocollo di Kyoto

Miglioramento e sostenibilità della gestione forestale
(**strategia di gestione**)

Nuove piantagioni forestali/afforestazione
(**strategia di espansione**)

Azioni contro gli incendi forestali e la deforestazione
(**strategia di conservazione**)

Biomasse per energia, lignocellulosa per i biocarburanti
(**strategia di sostituzione**)

Da Noble & Dirzo, Science, 1997

Messaggi

- ✓ **La protezione delle ecosistemi di montagna è fondamentale per gli equilibri ecologici ma anche per le “valli”**
- ✓ **Le foreste montane svolgono molti servizi ecosistemici (produzione, protezione, prevenzione dissesti, mitigazione cambiamenti climatici, microclima locale)**
- ✓ **Le foreste naturali ancora esistenti (serbatoi di carbonio) e la gestione sostenibile delle altre può rendere ancora più importante il loro ruolo nel ciclo del carbonio**
- ✓ **Ruolo rilevante degli andamenti climatici**
- ✓ **Cosa succederà in futuro?**
- ✓ **Necessità di studi a lungo termine, a scala globale e con approcci multipli**